Ecole d'Infirmier(e)s Anesthésistes Diplômé(e)s d'Etat

UE 7 - MEMOIRE PROFESSIONNEL

En vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste

2018-2020

ANALGESIE EN CHIRURGIE SENOLOGIQUE AVEC ET SANS PECS BLOCK

Introduction : En France, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. La prise en charge chirurgicale est une des solutions de l'arsenal thérapeutique. La prise en charge de la douleur est donc un objectif prioritaire. Le bloc paravertébral est actuellement recommandé par la SFAR. Toutefois, le pecs block a montré sa non-infériorité par rapport au bloc paravertébral dans une étude publiée en 2019 dans la revue Anesthesiology. Au CHU de Poitiers, la technique du pecs block est utilisée depuis 2017-2018.

Objectif : Le but de cette étude est d'évaluer la qualité de l'analgésie avec et sans pecs block lors de la chirurgie du sein. L'objectif principal est de comparer les consommations de morphiniques per-opératoires.

Matériel et méthode : Il s'agit d'une étude rétrospective, monocentrique, menée au CHU de Poitiers. Les dossiers étudiés portaient sur les patientes ayant subi une mastectomie partielle ou totale, avec ou sans pecs block.

Résultats : Pour les cas étudiés, il semble que le pecs block ait une influence sur la consommation de Sufentanil per-opératoire. De plus, la population qui a bénéficié d'un pecs block a moins eu recours à la morphine en SSPI.

Conclusion : Le pecs block a montré son intérêt dans la chirurgie du sein dans de nombreuses études. Pour mesurer son impact au CHU de Poitiers, il serait intéressant de réitérer cette étude avec des données plus récentes et d'étendre l'observation à j+1 pour avoir une vision plus globale de la qualité d'analgésie.

Mots clés : Pecs block, chirurgie du sein, analgésie

Auteur : REYNAUD Alison

Directeur de mémoire : Docteur Garnier Céline